

2091-

1250002412

Neudo®-Vital Obst-Spritzmittel

natürlicher Blattdünger aus spurenelement-
reichen Pflanzenextrakten.

- fördert die optimale Ernährung
von Obstbäumen und -sträuchern
- vitale Pflanzen sind weniger
anfällig für Pilzkrankheiten
- keine schädlichen Auswirkungen
auf den Naturhaushalt



Anwendung: Neudo®-Vital Obst-Spritzmittel
möglichst frühzeitig anwenden, um ein gesundes
und vitales Pflanzenwachstum zu fördern.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Siehe innenstehende Hinweise.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Siehe innenstehende Hinweise.

Entsorgung: Die restentleerte Verpackung
gehört in die Wertstoffsammlung.



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

organisch-mineralischer PK-Dünger 0,3-6, flüssig unter Verwendung von Düngemitteln und pflanzlichen Stoffen

0,3 % Gesamtphosphat (P_2O_5), 0,2 % neutral-ammoniumcitratlösliches Phosphat (P_2O_5),
6,0 % Gesamtkaliumoxid (K_2O)

Inhalt: 250 ml = 263 g netto

Hersteller & Vertreiber: W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal · Germany · Tel. +49 (0) 51 55/6 24-0 · www.neudorff.de

Ausgangsstoffe: Kaliumdüngerlösung, pflanzliche Stoffe (Algen) **Nebenbestandteile:** 0,5 % wasserlöslicher Schwefel (S), 25,0 % organische Substanz **Aufbereitungshilfsmittel:** Enthält natürliche Fettsäuren als Emulgator **Lagerung:** Frostfrei. Für Kinder und Haustiere unerreikbaar lagern. **Anwendung:** Siehe innenstehende Hinweise. **Weitere Hinweise:** Empfehlungen der amtlichen Beratung gehen vor.



Hier öffnen!
Wichtige
Infos!

Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei auftretenden Beschwerden ärztlicher Behandlung zu-
führen. Bei Berührung mit der Haut mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen
gründlich mit Wasser abspülen. Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung.

Allgemeine Pflegetipps: Unterstützen Sie Ihre Pflanzen, indem Sie
vorbeugende Maßnahmen gegen Pilzkrankheiten ergreifen.

Kultur	vorbeugend gegen	Maßnahme	Anwendungszeitpunkt
Pfirsich	Kräuselkrankheit	Bäume regelmäßig auslichten	Ab Spreizen der ersten Blattknospen (oft schon Ende Februar/Anfang März!) 3x im Abstand von 7-10 Tagen wiederholen
Birne	Birnengitterrost	Birnen nicht in der Nähe von Wacholder pflanzen	Ab Mitte April Behandlun- gen im Abstand von 7 Tagen
Kirsche	Monilia-Spitzendürre	Bäume regelmäßig auslichten	Ab Sichtbarwerden der ersten Blütenblätter 4 x im Abstand von 7 Tagen
Kirsche	Sprühfleck- krankheit	Bäume regelmäßig auslichten	Ab Ende der Blüte 4 x im Abstand von 7 Tagen
Kern- und Steinobst	Monilia- Blütenfäule	Bäume regelmäßig auslichten	Von Blühbeginn bis Ende der Blüte im Abstand von 5-7 Tagen
Apfel	Echter Mehltau	Kurz vor dem Austrieb befallene Triebspitzen entfernen	Von Austriebsbeginn bis Mitte Juni alle 7 Tage
Kernobst	Fruchtfäule (Monilia- Fruchtfäule)	Schadinsekten wie Apfel- u. Pflaumenmaden, Kirsch- maden bekämpfen um Verletzungen zu vermeiden	Jeweils 4, 3 und 2 Wochen vor der Ernte spritzen

Pflaume, Zwetsche	Narren- oder Taschenkrankheit	Bäume regelmäßig auslichten	Ab Blühbeginn 2 Behandlungen im Abstand von 5-7 Tagen
Stachel-, Johannisbeere	Echter Mehltau	Kurz vor dem Austrieb befallene Triebspitzen entfernen	Ab Austriebsbeginn alle 7 Tage
Johannisbeere	Rost	Johannisbeeren nicht in die Nähe von Kiefern pflanzen	Im Mai und Juni alle 7-10 Tage
Erdbeere	Grauschimmel	Im Frühjahr maßvoll mit Azet BeerenDünger düngen	Von Blühbeginn bis Ende der Blüte alle 7 Tage
Kernobst	Schorf	Bäume regelmäßig auslichten	Ab Austriebsbeginn bis Ende Juni alle 10 Tage
Zierpflanzen	Echter Mehltau, Rost, Sternrußtau	Befallene Blätter und Falllaub im Herbst entfernen	Ab Austriebsbeginn alle 7-10 Tage
Gemüse z.B. Gurke, Kürbis, Zucchini	Echter Mehltau, Grauschimmel	Auf ausreichende Pflanzabstände achten	Während der Wachstumsphase alle 7-10 Tage behandeln

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch schütteln! Messbecher abschrauben und Spitze des Spritzverschlusses mit einem Messer abschneiden.

Anwendung

1 %ig, d.h. 10 ml Konzentrat auf 1 Liter Wasser.

Konzentrat in eine Spritze geben, mit Wasser auffüllen und gut schütteln. Pflanzen tropfnass einsprühen. Auch Blattunterseiten mitbehandeln. Nie bei starker Sonneneinstrahlung anwenden.

Anwendungszeitpunkt siehe Tabelle. Nicht bei Temperaturen über 25°C spritzen!

